

Nalaz i prateću medicinsku dokumentaciju je **moгуće slati poštom** na adresu koju naznačite na prijemnom šalteru **ili lično** !



Putem telefona
021/ 480 5600 ili 021/ 480 5601

moгуće se informisati o tome kada da dođete po nalaz i prateću medicinsku dokumentaciju koja se zadržava do opisivanja nalaza.

Ukoliko dolazite lično javljate se osoblju na pultu Centra za imidižing dijagnostiku, Instituta za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica i preuzimate nalaz.

Ukoliko nalaz preuzima druga osoba za Vas neophodno je da se javi sa odgovarajućim ovlašćenjem na prijemnom pultu radi preuzimanja nalaza.

Ukoliko želite nalaz je **moгуće slati i poštom** na adresu koju naznačite administrativnom osoblju na prijemnom pultu.

Ako ste hospitalizovani te ste došli sa odeljenja, nalaz ne preuzimate Vi, već se on dostavlja elektronskim putem kroz bolnički informacioni sistem nadležnom, ordinirajućem lekaru.



Kontakt i informacije

Institut za onkologiju Vojvodine
Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica

(021) 480 56 00 (021) 480 56 01
www.onk.ns.ac.rs

 **INSTITUT ZA ONKOLOGIJU
VOJVODINE**

 **Centar za
IMAGING Dijagnostiku**



**PREGLED
KOMPJUTERIZOVANOM
TOMOGRAFIJOM**

CT- SKENER

**INFORMATOR ZA
PACIJENTE**

Šta je to Kompjuterizovana tomografija - CT skener ?

Kompjuterizovana tomografija (CT) je savremena, bezbolna i neinvazivna dijagnostička metoda pomoću koje se kombinacijom rendgenskih zraka i složene kompjuterske obrade podataka, dobijaju slike unutrašnjosti organizma odnosno posmatrane regije i organa od interesa.



Doza zračenja kojoj je pacijent izložen u toku ovog pregleda zavisi od dužine trajanja i vrste pregleda. Nekoliko puta je veća nego pri standardnom rendgenskom snimanju ali svi protokoli za snimanje na CT aparatu su prilagođeni da se sa najmanjom mogućom dozom dobiju optimalni i kvalitetni dijagnostički snimci.

Kako da se pripremim ?

Pre započinjanja CT pregleda potrebno je obavestiti nadležnog lekara o mogućoj trudnoći jer **primena zračenja u trudnoći može štetiti plodu**. Ako planirate trudnoću, najbolje bi bilo obaviti pregled u prvih 10 dana menstrualnog ciklusa da bi se izbeglo štetno dejstvo zračenja na eventualno početnu trudnoću.

Ukoliko nije drugačije naglašeno, pregled ne zahteva posebnu pripremu.

Poželjno je da pacijent pre pregleda ne jede 3-4 sata da bi želudac bio prazan.

Sa sobom obavezno ponesite

- **važeci uput za zakazani CT pregled,**
- **važecu-overenu zdravstvenu knjižicu**
- **relevantnu medicinsku dokumentaciju vezanu za Vaš medicinski pregled** (izveštaj lekara specijaliste koji traži određeno snimanje, kao i nalaze prethodno načinjenih radioloških pregleda u formi slike, CD-a i teksta), **kao i nalaz kreatinina (ne stariji od 7 dana).**

Kako pregled teče ?

Pregled se započinje kada Vas radiološki tehničar **prozove i uvede** u prostoriju za snimanje gde sa sebe morate skinuti sve metalne stvari i kaiš koji sve vreme ostaju u istoj prostoriji sa vama, a gde niko drugi ne ulazi.

Ukoliko to pregled nalaže, radiološki tehničar će Vam **plasirati braunilu (iglu) u venu** kroz koju će se aplicirati kontrastno sredstvo neophodno za snimanje.

Nakon toga Vas **postavljaju na sto** za pregled koji se tokom pregleda **pokreće i ulazi u poluotvoreni „tunnel“** aparata.

U toku snimanja nalazite se sami u prostoriji gde se vrši CT pregled ali Vas stručno medicinsko osoblje **sve vreme nadzire** kroz stakleni prozor, kao i čuje preko posebnog sistema–interfona.

Ukoliko to pregled zahteva, medicinsko osoblje može zatražiti **da nakratko prestanete disati – zadržite dah.**

Veoma je važno da tokom čitavog pregleda budete potpuno mirni kako se pokretima ne bi narušio kvalitet slike !

Nakon završenog pregleda uzimate svoje stvari koje ste pre snimanja odložili i dobijate informaciju o okvirnom vremenu i mogućem načinu preuzimanja nalaza.

IMA LI OPASNOSTI ?

Nekada, mada retko, mogu nastupiti neželjene reakcije kod intravenskog davanja kontrastnog sredstva, a **ukoliko je kod Vas već prethodno zabeležena alergijska reakcija prilikom primene kontrasta o tome morate obavestiti radiološkog tehničara pre započinjanja snimanja.**

Kao i kod svake druge injekcije, na mestu uboda može isteći manja količina krvi, a kasnije na mestu uboda može eventualno zaozdati modrica.

Moguće je pucanje vene prilikom davanja kontrastnog sredstva.

Povremeno su zabeleženi i osjećaj toplote na mestu davanja kontrasta, promenjen ukus u ustima, osip, mučnina, vrtoglavica, glavobolja.

Izuzetno retko može doći do pada krvnog pritiska, bolova u telu, otoka usana i jezika, gušenja.

Ukoliko bi nastupile neželjene pojave potrebno je da obavestite prisutno medicinsko osoblje, a lekarska pomoć biće Vam odmah na raspolaganju !



NAŠ CT APARAT NA KOME ĆETE BITI PREGLEDANI